

# CODIFOL

30 - 10 - 10



Composición	p / v
Nitrógeno Total	30.00 %
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	10.00 %
Potasio (K <sub>2</sub> O)	10.00 %
Ácidos Policarboxílicos	5.00 %
Microelementos	0.50 %
Densidad	1.40 - 1.50 g/mL
pH	6.0 - 7.0

**CODIAGRO**

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.  
*Soluciones para la agricultura moderna*

[www.codiagroperu.com](http://www.codiagroperu.com)

# CARACTERÍSTICAS

- 1** CODIFOL 30-10-10 es un fertilizante foliar líquido a base de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Microelementos, enriquecidos con Ácidos Policarboxílicos, desarrollado especialmente para promover un rápido crecimiento vegetativo.
- 2** CODIFOL 30-10-10 aporta un alto nivel de Nitrógeno recomendado para obtener un crecimiento activo y cuando es necesario corregir deficiencias de este elemento en los cultivos. Esta formulación nos ayuda a complementar necesidades nutricionales en los periodos críticos del cultivo donde las necesidades de nitrógeno son esenciales.
- 3** CODIFOL 30-10-10 contiene Ácidos Policarboxílicos que ayuda a la asimilación de los elementos y el transporte dentro de la planta a los órganos donde esta lo requiere.

# CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa: Sierra y Costa	0.5 - 1.0	1° A los 25 días de la siembra, 2° 15 a 20 días después de la primera.
Lechuga, Col, Brócoli, Apio	0.5 - 1.0	1° Cuando ya tenga hojas bien formadas, 2° 15 días después de la 1°, 3° 15 - 20 días después de la segunda.
Liliáceas: Cebolla, Ajo, Poro	0.5 - 1.0	1° Cuando las plantas tengan de 8 a 10 cm de altura, 2° 20 días después de la primera.
Cucurbitáceas: Melón, Sandía, Zapallo, Pepinillo	0.5 - 1.0	1° Cuando las plantas tienen 2 hojas verdaderas, 2° 15 días después de la primera.
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika	0.5 - 1.0	1° 20 días después del trasplante. Repetir 2 a 3 veces antes de la floración y siembra con intervalos de 15 días.
Leguminosas: Frijol, Arveja	0.5 - 1.0	1° A los 20 días de emergencia, 2° a los 15 días de la 1°, 3° a los 15 días de la segunda.
Espárrago	0.5 - 1.0	Aplicar en brotamiento.
Algodón	0.5 - 1.0	1° Después del desahije y repetir en 2 a 3 oportunidades cada 15 días..
Frutales, Cítricos, Palto, Olivo, Mango	1.5 - 2 L/ha	1° Al inicio del brotamiento, 2° 15 días después de la 1°, 3° 15 días después de la segunda.
Arroz	0.5 - 1.0	1° Aplicación 15 días después del trasplante, 2° Antes del macollamiento.
Plantas ornamentales y aromáticas	1.5 - 2 L/ha	1° A los 25 días de la siembra, 2° 15 a 20 días después de la 1°, 3° 15 días después de la segunda.
Caña de azúcar	0.5 - 1.0	45 - 50 días después del corte.
Maíz	0.5 - 1.0	Aplicar 30 - 50 días después de la siembra.
Vid	0.5 - 1.0	1° Al inicio del brotamiento. 2° 20 días después de la primera.

Distribuido por:  
**Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.**  
Av. Argentina 1959, Callao – Perú  
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108  
E-mail: [ventas@codiagroperu.com](mailto:ventas@codiagroperu.com)  
Web Site: [www.codiagroperu.com](http://www.codiagroperu.com)



CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.  
*Soluciones para la agricultura moderna*