

# CODI – MOL 84

## Materia Orgánica Líquida



Composición	p / v
Materia Orgánica Total	84.00 %
Ácidos Policarboxílicos	31.00 %
Nitrógeno (N)	6.0 %
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	1.00 %
Potasio (K <sub>2</sub> O)	4.50 %
Magnesio (MgO)	1.50 %
Boro (B)	50 ppm
Hierro (Fe)	700 ppm
Manganeso (Mn)	50ppm
Zinc	50ppm
pH	4.0 - 5.0
Densidad	1.15 - 1.25 g/mL

**CODIAGRO**

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.  
*Soluciones para la agricultura moderna*

[www.codiagroperu.com](http://www.codiagroperu.com)

# CARACTERÍSTICAS

- 1** CODI – MOL 84 es una enmienda orgánica vegetal líquida. Con alta concentración de ácidos policarboxílicos enriquecido con Macro y Micronutrientes de rápida asimilación y disponibilidad para la planta.
- 2** CODI – MOL 84 mejora las propiedades físico - químicas y biológicas del suelo, acompleja los nutrientes del suelo, haciéndolos disponibles a la planta. Incrementa la retención de humedad del suelo y estimula el desarrollo radicular, mejora la Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo (CIC), por lo cual los nutrientes aportados por medio de la fertilización de base, quedan a disposición de las raíces, en lugar de ser lavados o fijados en el suelo en formas no disponibles.
- 3** CODI – MOL 84 por su contenido de Ácidos Policarboxílicos, Macro y Micronutrientes dará a la planta una adecuada y balanceada nutrición vegetal.

## CUADRO DE USOS

### Aplicaciones Foliare

Aplicar a la dosis de 1 - 2 L/200 L para todo tipo de cultivo a lo largo del ciclo vegetativo

### Aplicaciones al suelo (sistema de riego o drench)

CULTIVO	DOSIS (L/HA)	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0.25 – 0.5	Aplicar 30 días después de la siembra y repetir antes de la floración.
Hortalizas, Leguminosas	0.25 – 0.5	Aplicar 20 – 30 días después de la siembra y repetir 15 días después.
Tomate, Ají, Páprika, Pimiento	0.25 – 0.5	Aplicar 15 días después del trasplante y antes de la floración.
Espárrago	0.25 – 0.5	Aplicar al inicio de cada brotamiento vía sistema de riego.
Algodón	0.5 – 1	Aplicar 30 días después de la siembra, en pre-floración y al llenado de las bellotas.
Vid	0.5 – 1	Realizar las aplicaciones luego del brotamiento de las yemas, repetir 15 días después vía sistema de riego o en drench al cuello de planta.
Cebolla, Ajo	0.25 – 0.5	Aplicar en almácigo y a los 15 días después del trasplante en drench o vía sistema de riego.
Alcachofa	0.25 – 0.5	Aplicar en almácigo 1 – 2 veces, luego del trasplante en 2 a 3 oportunidades según requiera el cultivo.
Cítricos, Palto y otros frutales	0.25 – 0.5	Aplicar al inicio de la campaña y repetir 2 veces más cada 15 días.
Arroz	0.25 – 0.5	Aplicar a los 7 – 10 días después del trasplante, 15 días después y en punto de algodón.
Maíz, Caña de azúcar	0.25 – 0.5	30 días después de la siembra y repetir 15 días después.



CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.  
Soluciones para la agricultura moderna

Distribuido por:  
**Consortio Distribuidor Agrícola S.A.C.**  
Av. Argentina 1959, Callao – Perú  
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108  
E-mail: [ventas@codiagroperu.com](mailto:ventas@codiagroperu.com)  
Web Site: [www.codiagroperu.com](http://www.codiagroperu.com)