

FICHA TECNICA

PRODUCTO: CODIQUEL - Ca

EMBALAJE: Envase de 1 L
Envase de 20 L.
Envase de 200 L.

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

DESCRIPCIÓN	P/V
Calcio (CaO)	10.00 %
Ácidos Policarboxílicos	10.00 %
Aminoácidos Libres	5.00 %

HOJA DE SEGURIDAD

1.- Identificación del producto:

Marca: CODIQUEL - Ca

Distribuidor: Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.

Av. Argentina 1959 Callao

Lima - Perú

Telefax:(511) 4296216 Anexo 108

E-mail: servicioalcliente@codiagroperu.com

Web: www.codiagroperu.com

2.- Composición / información:

CODIQUEL - Ca, es un producto a base de Calcio, Ácidos Policarboxílicos y aminoácidos Libres, especialmente formulado para suplir deficiencias de este elemento rápidamente en etapas críticas del cultivo.

3.- Resumen de riesgos:

Producto ligeramente tóxico e irritante.

4.- Primeros Auxilios:

Tras contacto con la piel:

Lavar con agua.

Tras contacto con los ojos:

Lavar con abundante agua.

Tras ingestión:

Beber abundante agua.

Inhalación:

No irritante.

5.- Medidas en caso de incendio:

Medios de extinción adecuados:

Agua o cualquier otro

Peligros especiales de exposición:

Equipo de Protección Personal contra incendios

Productos de combustión peligrosos:

Ninguno.

6.- Medidas a tomar en caso de derrame accidental:

Precauciones personales:

Ninguna precaución especial

Precauciones para el medio ambiente:

Diluir el producto con agua

Métodos de limpieza:

Limpieza con agua

7.- Manipulación y almacenamiento:

Manipulación : Guantes, careta de protección y overol largo.
Condiciones de Almacenamiento Almacenar en envases cerrados herméticamente, en lugar seco y fresco.

8.- Control de la exposición / Protección individual:

Protección personal: No se requieren medidas especiales.
Se recomienda el uso de guantes: Si
Protección de los ojos: Gafas protectoras.

9.- Propiedades Físicas

Aspecto: Líquido marrón.
Olor: Característico.
Densidad: 1.25 – 1.30 g/mL
pH: 4.5 – 6.5
Punto de fusión: No procede.
Punto de inflamación: No inflamable.
Solubilidad: Forma soluciones estables en agua.
Otra información: No procede.

10.- Estabilidad y reactividad:

Condiciones a evitar: No detectadas
Materias a evitar: No detectadas
Pruebas de descomposición
Peligrosa: No detectadas

11.- Propiedades toxicológicas:

Toxicidad oral aguda (DL50): No disponible
Irritación cutánea: No
Toxicidad por inhalación (CL50): No procede
Irritación ocular: No disponible

12.- Información ecológica:

Movilidad: No disponible
Persistencia: No disponible
Potencial de bioacumulación: No disponible
Toxicidad acuática: No disponible
Toxicidad para plantas acuáticas: No disponible

13.- Consideraciones relativas a su eliminación:

Modalidad:	Como cualquier residuo, según leyes específicas de regulación por el SENASA
Producto:	No es peligroso
Envases y embalajes:	Lavar con abundante agua No utilizar para otros productos. Tener en cuenta la legislación vigente aplicable a la reutilización o eliminación de embalajes/envases.

14.- Información relativa al transporte:

ADR: No clasificable como mercancía peligrosa.

15.- Información reglamentaria:

No necesaria

16- Otras informaciones:

La información de esta ficha de datos de seguridad del producto, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primeramente una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

La información facilitada corresponde a nuestro conocimiento del producto en la fecha de publicación.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200L)	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACION
Papa	0.5 – 1.0	Aplicar al inicio de la floración y repetir cada 15 días haciendo tres aplicaciones como mínimo.
Algodón	0.5 – 1.0	Aplicar al inicio de la floración y repetir cada 15 días haciendo tres aplicaciones como mínimo.
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika	0.5 – 1.0	Aplicar al inicio de la floración y en fructificación, hacer tres aplicaciones como mínimo.
Brócoli, Coliflor	0.5 – 1.0	Aplicar al inicio de la formación de la inflorescencia y repetir a los 15 días.
Lechuga, Apio, Col	0.5 – 1.0	Aplicar desde los 30 días después del trasplante y repetir cada 5 días por 4 veces.
Espárrago	1.0 – 2.0	Aplicar a partir del tercer brote cada 15 días , repetir las aplicaciones durante 3 a 4 veces.
Vid	0.5 – 1.0	Aplicar desde que la uva tenga 3 mm. De diámetro cada 15 días 3 a 4 veces.
Arroz	0.5 – 1.0	Aplicaren punto de algodón y al inicio del llenado de la espiga.
Alcachofa	0.5 – 1.0	Aplicar después del trasplante y cada 15 días de 2 a 3 veces, al inicio de la floración y formación de capítulos.
Maíz	0.5 – 1.0	Aplicar al inicio del llenado de mazorca.
Frutales, Cítricos, Palto, Mango, Olivo	1.5 – 3.0 L/Ha	Aplicar al inicio de la floración en el cuajado del fruto y crecimiento de los frutos.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de reacción alcalina. Es compatible con los productos de protección vegetal sin embargo, se recomienda realizar pruebas a nivel de campo.