

CODI - NEMA

SUPRESOR DE NEMÁTODOS CON EFECTO
BIOESTIMULANTE Y ENRAIZADOR



- Supresor de nemátodos de amplio espectro.
- Tiene efecto bioestimulante y enraizador
- No causa toxicidad a la planta
- No es tóxico, no contamina el medio ambiente.
- Estimula la formación de fitoalexinas.
- Permitido para uso en agricultura orgánica.



CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

www.codiagroperu.com

COMPOSICIÓN

La molécula *Biovermax* contiene:

Descripción	p / p
Materia Orgánica	25.00 %
Ácidos Policarboxílicos	5.00 %
Extracto de Algas	5.00 %
Aminoácidos Libres	5.00 %
Derivados polifenólicos	15.00 %
pH	3.2 - 3.8
Densidad	1.25 - 1.30 g/mL

CARACTERÍSTICAS

- 1 CODI-NEMA es un producto diseñado para incentivar la producción de fitoalexinas, sustancias de defensas de las plantas, que ayudan a suprimir los nemátodos presentes tanto en el suelo como en la raíz, evitando que dañen a la planta.
- 2 CODI-NEMA tiene efecto bioestimulante. Es un producto de origen natural, no deja residuos y no destruye la fauna benéfica del suelo evitando así el efecto de degradación de los suelos por causa de los plaguicidas.
- 3 CODI-NEMA es de rápida absorción gracias a la concentración de Ácidos Policarboxílicos en su composición, siguiendo así un mejor contacto con los nemátodos en el área radicular.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa, Camote	3 - 5	Aplicar vía drench cuando tenga 2 a 3 hojas verdaderas, repetir al inicio de formación de estolones y luego al llenado del tubérculo.
Algodón	3 - 5	Aplicar después del desahije, al inicio de la floración y al inicio del belloteo (drench o sistema).
Tomate, Aji, Párika, Pimiento	3 - 5	Aplicar 15 días después de la siembra, en inmersión de plántulas, al transplante (drench) al inicio de floración (drench o sistema) y en fructificación (sistema).
Brócoli, Coliflor, Alcachofa	3 - 5	Aplicar al momento de transplante en el tratamiento de raíces (inmersión) y 15 días después del transplante (drench o sistema), repetir al inicio de la formación de la inflorescencia.
Lechuga, Apio, Col, Cebolla, Cebollín	3 - 5	Aplicar (drench o sistema) desde los 15 días después del transplante, repetir a los 15 días de la 1ra y otra 15 días después de la 2da aplicación.
Espárrago	3 - 5	Aplicar al momento de la siembra, al inicio de campaña y al inicio de cada nuevo brote (drench o sistema).
Frutales, Cítricos, Melocotonero, Olivo, Manzano	4 - 7	Aplicar al inicio de cada campaña, floración y cuando los frutos tengan 2 cm de diámetro (drench o sistema).
Flores, Clavel, Gypsophilla	3 - 5	Aplicar desde la formación de esquejes, al inicio de botoneo y en plena floración (drench o sistema).
Vid	4 - 7	Aplicar en post - cosecha, después de la poda y después del brotamiento.
Ajo	4 - 7	Tratar la semilla (0.5 L/100L de agua). Aplicar 20 - 25 días después de la siembra, realizar 2 - 3 aplicaciones a intervalos de 15 - 20 días (drench).
Zapallo, Melón, Sandía, Pepinillo	3 - 5	Aplicar a la presencia de la 1ra hoja verdadera, Sandía, Pepinillo repetir 3 a 4 veces con intervalos de 12 - 15 días (drench).
Fresa	3 - 5	Aplicar a los 25 días del transplante y realizar tres aplicaciones con intervalos de 15 días.
Frijol	3 - 5	Aplicar a los 25 días después de la siembra y realizar 3 a 4 aplicaciones con intervalos de 15 días.

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: servicioalcliente@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna