

CODI-ZYMETF

BIOESTIMULANTE CON PROMOTORES HORMONALES
DE GIBERELINAS, AUXINAS Y CITOQUININAS



Composición	p / v
Microelementos (Mn, Zn, Fe, Mg, B, S)	19.3 g/L
Extractos de origen vegetal y fitohormonas biológicamente activas	820 g/L
Promotores de Giberelinas	0.031 g/L
Promotores de Auxinas	0.031 g/L
Promotores de Citoquininas	0.083 g/L



CONTROL UNION - PERU
MEMBER OF CONTROL UNION WORLD GROUP

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

- 1** **CODI-ZYME TF** es un complejo de extractos vegetales que son promotores de Giberelinas, Auxinas y Citoquininas enriquecida con microelementos.
- 2** **CODI-ZYME TF** estimula los diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas como la división y diferenciación celular, translocación de sustancias, síntesis de clorofila, diferenciación de yemas, uniformidad en floración y amarre de flores y frutos.
- 3** **CODI-ZYME TF** por su composición de microelementos y otros nutrientes dará una adecuada y balanceada nutrición a las plantas, lográndose mejorar la calidad de los frutos e incrementar los rendimientos.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alcachofa	0.5	Aplicar 30 días después del transplante, repetir 20 días después de la segunda aplicación.
Papa	0.5	Aplicar al inicio de la formación de tubérculos y repetir a los 15-30 días.
Espárrago	0.45 – 0.5	Aplicar el 1er y 2do brotamiento.
Arroz	0.45 – 0.5	Aplicar 30 días después del transplante, repetir 20 días después de la segunda aplicación.
Hortalizas, Maíz	0.5	Aplicar a los 30 a 45 días después de la siembra y repetir a los 15 – 30 días.
Leguminosas	0.45 – 0.5	Aplicar 30 días después de la siembra y en pre-floración.
Tomate, Ají, Pimiento, Páprika	0.5	Aplicar al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos
Vid	0.5 – 0.75	Aplicar al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos
Cucurbitáceas, Algodón	0.45 – 0.5	Aplicar 30-45 días después de la siembra, repetir 20 días después de la segunda aplicación
Café, Cacao	0.45 – 0.5	Aplicar al inicio del brotamiento y en pre-floración.
Cítricos, frutales (Mango, Palto, Manzano)	0.5 – 0.75	Aplicar en el brotamiento, repetir 20 días después y en pre-floración.