


CODIQUEL CaB+Zn

FERTILIZANTE FOLIAR CALCIO, BORO + ZINC
DE ALTA ASIMILACIÓN



Composición	p / v
Calcio (CaO)	12.00 %
Boro (B) Acomplejado con Etanolamina	1.00 %
Zinc (Zn)	1.00 %
Ácidos Policarboxílicos	1.00 %
Densidad	1.25 - 1.30 g/mL
pH	4.5 - 6.5



CONTROL UNION - PERU
MEMBER OF CONTROL UNION WORLD GROUP

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

- 1** **CODIQUEL Ca-B + Zn** es un fertilizante con alto contenido de Calcio y Boro altamente asimilables y disponibles para las plantas enriquecido con Zinc, es recomendable para todo tipo de cultivos para prevenir y corregir deficiencias de estos elementos.
- 2** **CODIQUEL Ca-B + Zn** previene la caída de flores y frutos y la pudrición apical en tomate y pimiento, mejora la calidad del producto cosechado. El Calcio es un nutriente indispensable para el crecimiento, floración y fructificación de los cultivos pues es componente de la pared y membrana celular. Interviene en diversas funciones bioquímicas de la planta como la división y elongación celular, maduración de frutos, germinación de semillas, etc. El Boro facilita el transporte de azúcares y la síntesis de pectinas de las paredes celulares. El Zinc actúa como estabilizador de la molécula de clorofila, regula la expresión genética de las plantas, participa en la formación de proteínas y activa la formación de auxinas.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0.5 - 1.0	Aplicar luego de la floración cada 15 días haciendo dos aplicaciones como mínimo.
Algodón	0.5 - 1.0	Aplicar luego de la floración cada 15 días haciendo dos aplicaciones como mínimo.
Tomate, Ají, Páprika y Pimiento	0.5 - 1.0	Aplicar antes de la floración y en plena fructificación, realizar tres aplicaciones como mínimo.
Brócoli, Alcachofa	0.5 - 1.0	Aplicar al inicio de la formación de la inflorescencia y repetir a los 15 días.
Lechuga, Apio	0.5 - 1.0	Aplicar desde los 30 días después del trasplante y repetir cada 10 días en 3 oportunidades.
Espárrago	1.0 - 1.5	Aplicar al primer brote y a inicios del segundo brote.
Vid	0.5 - 1.0	Aplicar desde que la uva tenga 3 mm de diámetro cada 15 días en 3 a 4 oportunidades.
Arroz	0.5 - 1.0	Aplicar en punto de algodón y al inicio del llenado de la espiga.
Maíz	1.5 - 2 L/ha	Aplicar a inicio de formación de mazorcas y repetir la aplicación a los 10 días.
Cítricos	0.5 - 1.0	1° al inicio de la floración, 2° a los 15 días después de la 1° aplicación.
Palto, Mango	0.5 - 1.0	1° al inicio del brotamiento, 2° inicio de floración, 3° en el cuajado del fruto.
Olivo	0.5 - 1.0	1° antes de la floración, 2° 2 a 3 meses después, 3° cuando el fruto este engordando.
Caña de Azúcar	0.5 - 1.0	Aplicar a los 45 días después del corte.
Cebolla	0.5 - 1.0	Aplicar 15 días después del trasplante, al inicio del bulbeo y llenado de cabezas.

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: ventas@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna